


Drépanocytose et fièvre

**CONDUITE À TENIR
EN CAS DE FIÈVRE À DOMICILE**



RoFSED

La fièvre chez l'enfant drépanocytaire est le plus souvent due à une infection, mais elle peut aussi accompagner une crise douloureuse. Il faut être très vigilant en cas de fièvre, parce que les infections, en particulier à pneumocoques, peuvent être très sévères.

Qu'est-ce que la fièvre ?

On parle de fièvre quand la température de votre enfant est supérieure ou égale à 38°C.



Quand prendre la température de votre enfant ?

Il faut prendre la température de votre enfant dès que vous le trouvez chaud, qu'il a des sueurs, des frissons ou la chair de poule.

MAIS AUSSI :

- s'il refuse de manger,
- s'il est plus pâle que d'habitude,
- s'il est fatigué,
- s'il vomit,
- s'il tousse,
- s'il se plaint d'avoir mal,
- s'il a soif de façon inhabituelle.



Conduite à tenir en cas de fièvre confirmée



- Découvrez votre enfant (vêtements légers et amples).



- Donnez lui du paracétamol (Doliprane®, Efferalgan®, selon l'ordonnance de votre médecin).



- Faites-le boire régulièrement, même s'il n'a pas soif.



- Aérez la pièce en l'absence de votre enfant (10 minutes suffisent) et maintenez la température de la pièce entre 18 et 20°C.



- Ne lui faites pas d'enveloppement froid (risque de crise douloureuse).

- Apprenez à chercher des signes associés (pâleur des paumes, des plantes de pieds ou des conjonctives, couleur jaune des yeux et des urines, augmentation de la taille de la rate...).



Comment prendre sa température ?

LES DIFFÉRENTS TYPES DE THERMOMÈTRES



- Le **thermomètre digital** ou électronique



- Le **thermomètre au gallium**



- Le **thermomètre auriculaire**
ou frontal infra-rouge (coût important)

L'ENTRETIEN DU THERMOMÈTRE

- Nettoyez-le à l'eau froide et au savon puis utilisez un antiseptique (alcool à 90°...)
- Rangez-le toujours au même endroit, loin d'une source de chaleur (soleil, radiateur, ...)
- Vérifiez régulièrement l'état des piles, et prévoyez des piles de rechange.

LA MESURE DE LA TEMPÉRATURE



- **Sous les aisselles *** :
5 minutes
ou dès le signal sonore



- **Par voie auriculaire**
ou **frontal infra-rouge** :
Peu fiable avant l'âge de 2 ans,
car le conduit auditif
est trop étroit.

*** ATTENTION :**
certains modes de prise
de température nécessitent
un ajustement.
Se référer à la notice.



Votre enfant a moins de 3 mois

Il a plus de 38°C : 

→ VOUS DEVEZ L'EMMENER AUX URGENCES DE L'HÔPITAL



Votre enfant a moins de 3 ans

1 Il a plus de 38,5°C : 

→ VOUS DEVEZ L'EMMENER AUX URGENCES DE L'HÔPITAL

On lui fera des prélèvements de sang et d'urine (à la recherche d'une infection) et une radio du thorax.



2 Il a entre 38°C et 38,5°C 

il présente des signes de gravité :

- il est très pâle
- il vomit
- il respire mal
- il est très douloureux
- il est très fatigué
- il a mal au thorax
- son ventre est ballonné

→ VOUS DEVEZ L'EMMENER AUX URGENCES DE L'HÔPITAL



3 Il a entre 38°C et 38,5°C 

sans signes de gravité :

→ IL DOIT ÊTRE VU LE JOUR MÊME PAR VOTRE MÉDECIN TRAITANT

Votre enfant a plus de 3 ans



1 Il a plus de 39,5°C



sans signes de gravité :

→ VOUS DEVEZ L'EMMENER AUX URGENCES DE L'HÔPITAL



2 Il a plus de 38°C



il présente des signes de gravité :

- il est très pâle
- il vomit
- il respire mal
- il est très douloureux
- il est très fatigué
- il a mal au thorax
- son ventre est ballonné

→ VOUS DEVEZ L'EMMENER AUX URGENCES DE L'HÔPITAL



3 Il a plus de 38,5°C



sans signes de gravité :

→ IL DOIT ÊTRE VU LE JOUR MÊME PAR VOTRE MÉDECIN TRAITANT



R o F S E D

HÔPITAL NECKER
ENFANTS MALADES

149, RUE DE SÈVRES
75743 PARIS CEDEX 15
TEL. 01 44 49 56 09
rofsed@orange.fr

www.rofsed.fr